

Móvil Canelones Salud

MUNICIPIO LA PAZ

Dir.: Parque Metropolitano - La Paz

Del 05/09 al 09/09/2022

LUNES 05

TEST RÁPIDOS DE ANEMIA, HEPATITIS C, SÍFILIS, VIH, CONTROL DE GLICEMIA Y PRESIÓN ARTERIAL : de 8 a 12 hs.

VACUNACIÓN (antigripal y esquema): de 8 a 12 hs.

ODONTOLOGÍA: de 8 a 14 hs.

MARTES 06

TEST RÁPIDOS DE ANEMIA, HEPATITIS C, SÍFILIS, VIH, CONTROL DE GLICEMIA Y PRESIÓN ARTERIAL : de 8 a 12 hs.

VACUNACIÓN (antigripal y esquema) : de 13 a 16 hs.

ODONTOLOGÍA: de 8 a 14 hs.

PAP : de 8:30 a 12 hs.

MIÉRCOLES 07

TEST RÁPIDOS DE ANEMIA, HEPATITIS C, SÍFILIS, VIH, CONTROL DE GLICEMIA Y PRESIÓN ARTERIAL : de 8 a 12 hs.

ODONTOLOGÍA: de 8 a 14 hs.

VACUNACIÓN (antigripal y esquema): de 8 a 12 hs.

JUEVES 08

TEST RÁPIDOS DE ANEMIA, HEPATITIS C, SÍFILIS, VIH, CONTROL DE GLICEMIA Y PRESIÓN ARTERIAL : de 8 a 12 hs.

ODONTOLOGÍA: de 8 a 14 hs.

VACUNACIÓN (antigripal y esquema): de 13 a 16 hs.

PAP : de 8:30 a 12 hs.

VIERNES 09

TEST RÁPIDOS DE ANEMIA, HEPATITIS C, SÍFILIS, VIH, CONTROL DE GLICEMIA Y

PRESIÓN ARTERIAL : de 8 a 12 hs.

VACUNACION (antigripal y esquema) : de 8 a 12 hs.

ODONTOLOGÍA: de 8 a 14 hs.

HÁCETE TU TEST RÁPIDO DE HEPATITIS C

CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN DE LA HEPATITIS C EN SANTA LUCIA

REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE PAPANICOLAU: 48 hs previas no haber tenido relaciones sexuales ni haberse realizado ningún tratamiento médico: óvulos, cremas ni duchas vaginales .- No estar menstruando.- Higiene habitual. **Se entregan 16 números por orden de llegada.**

ODONTOLOGÍA: Extracciones dentarias- Detartrajes (limpieza de sarro)- Restauraciones (arreglos dentales)- Relevamiento. **Se entregan 10 números por orden de llegada.**

VACUNACIÓN - Esquema de vacunación.

Se podrán vacunar contra la GRIPE toda la población. Se priorizará a grupos de riesgo, niños de 6 meses a 4 años y 11 meses, servicios esenciales, mayores de 65 años, niños, adolescentes y adultos con enfermedades crónicas, embarazadas y puérperas hasta 6 meses.

- Menores de entre 5 y 11 años pueden recibir la dosis antigripal dejando un intervalo de 14 días entre la vacuna COVID-19.

- Niños menores de 8 años que reciban por primera vez la vacuna antigripal, deben recibir 2 dosis separadas por 4 semanas.

